

# 内視鏡的胃粘膜剥離術（ESD） 入院診療計画書②

作成日：2017年7月2日

患者ID：0

医師名：0

患者氏名：様

看護師名：0

日付	#####				1/1	1/2	1/3	1/4	1/5~1/7	
	入院当日	術前	術中	術後	1日後	2日後	3日後	4日後	5~7日後	
目標	精神的準備ができていない				消化管の症状・所見がない					
	不安の表出ができる		消化管の症状・所見がない			転倒予防行動ができる				
	治療について理解できる				副作用の症状・所見がない		自己管理ができる			
	治療について理解できる				治療について理解できる					
	治療について理解できる				日常生活の注意点について理解できる					
投薬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日常内服されているお薬を確認します。</li> <li>・中止となるお薬について説明があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今まで内服していた薬は医師の許可により中止薬以外の朝食後薬を起床時に内服します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>鎮静のための点滴を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・治療後に胃の粘膜を保護するお薬と出血を予防するお薬を開始します。</li> <li>・今まで内服していた薬は医師の確認後再開となります。それまでは服用しないで下さい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>胃カメラなどがある場合は内服を止めていただくことがあります。</li> </ul>					
注射			<ul style="list-style-type: none"> <li>・点滴を開始します。（右腕）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・治療終了後と6時間後に胃薬の点滴を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点滴を行います。</li> <li>・朝と夕方に胃薬の点滴を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点滴があります</li> <li>・経過によっては点滴終了となります。</li> </ul>				
検査	<ul style="list-style-type: none"> <li>採血、X線、心電図検査を行います。</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝採血を行います。</li> <li>・治療後の観察のため、胃カメラがあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>検査後3・6日後に採血があります。</li> </ul>			
処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入院時に身長・体重を測定します。</li> <li>・入院時と14時、20時ごろに検温を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起床時、出棟時に検温を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療中は常に血圧計を巻き、検温を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療後は、30分後、1時間後、2時間後と、20時ごろに検温を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退院まで午前と午後に必ず検温を行います。</li> <li>・上記以外にも状態に合わせて検温を行います。</li> </ul>					
活動・安静度 リハビリ 清潔・排泄	<ul style="list-style-type: none"> <li>病院内歩行してかまいません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・治療が始まるまではトイレ以外は安静にしてください。</li> <li>・治療後は症状がなければ2時間後からトイレまでの歩行は可能です。（医師の指示で変更となる場合があります。）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・治療中は医師の許可がない場合は、絶対安静となります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>適宜、清拭を行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>医師の指示によりシャワー浴可能となります。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>退院後の生活をイメージできるように生活指導していきます。</li> <li>・退院後下血がないか排便時観察して下さい。</li> <li>・食事は1週間程度消化の良い物を摂取するようにして下さい。</li> <li>・1週間程度は、血流が良くなるため、入浴は短時間でするようにして下さい。また、激しいスポーツは避けて下さい。</li> <li>・苦痛症状出現時は、すぐに受診するようにして下さい。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>医師の許可があれば入浴できます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>点滴スタンドには、キャスターがついています。滑りやすいので移動するときは、注意しましょう。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・採血結果でトイレ歩行可能になります。</li> <li>・急に起き上がるとふらつきがみられることがあります。そのようなときは看護師と一緒にトイレまで歩行します。</li> <li>・点滴スタンドには、キャスターがついています。滑りやすいので移動するときは、注意しましょう</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>入院生活・治療の経過についてオリエンテーションを行います。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・治療終了2時間後、体温・血圧測定を行います。</li> <li>・胃部不快感・吐き気などに変化が見られないときは、トイレまでの歩行が可能となります。看護師が医師に確認をとります。</li> <li>・内服薬に関しては、治療後は医師の確認後再開となります。それまでは服用しないで下さい。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・安静度は院内フリーです。</li> <li>・全身状態によって医師の指示のもと安静度が変更となる場合があります。</li> </ul>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検温時、前日の尿と便の1日の回数を確認します。</li> <li>・日常内服されているお薬を確認します。中止となるお薬について説明があります。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>排便があったとき、便に血液が混じるときは、排泄物を流さずトイレよりナースコールでお知らせ下さい。</li> </ul>					
食事	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療を行うため、胃の中を空にする必要があります。夜の9時以降飲んだり食べたりできません。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>治療後は胃の安静が大切になります。飲んだり、食べたりできません。</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>許可ができるまで、飲水はおやめ下さい。</li> </ul>					

※患者様の状態により、内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください

(横須賀共済病院 2017.11)