


































ピレスパ導入クリティカルパス 入院診療計画書	お名前:	主治医名:	担当看護師名:	作成年月日:
	氏名 様	氏名	担当看護婦	平成30年10月3日
	ID:患者ID			

日付	入院日	日付未入力 2~4日目	日付未入力 5~8日目	日付未入力 9~11日目	日付未入力 12~13日目	日付未入力 14日目
目標	入院生活の注意点が理解でき、治療に前向きに取り組める 転倒せずに歩行できる	正しい服用時間、疾患、副作用が理解できる			正しい服用時間、疾患、副作用、紫外線対策が理解できる	
投薬	 薬剤師が内服中のお薬をお預かりし確認します	 ピレスパ錠(600mg/日)を内服します ※ 食後にコップ1杯程度の水、またはぬるま湯で服用して下さい		 ピレスパ錠が1200mg/日に増量となります ※ 食後に服用します		
検査	 血液検査(採血)	 1/1 動脈からの採血	 1/4 血液検査	 1/8 血液検査	 1/11 血液検査	
	 胸部X線撮影	 1/1 検尿	 1/4 胸部X線撮影	 1/8 動脈からの採血	 1/11 胸部X線撮影	
	 心電図検査			 1/8 胸部X線撮影		
	 呼吸機能検査					
食事栄養	 特に制限はありません 特別な栄養管理の必要性 <input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	 制限はありません ピレスパ服用によって食欲が減退することがあります ご希望によって食事量や形態の調整を行うこともできますので、お知らせ下さい				
清潔	 入浴可能です。浴室の使用方法を説明します	 血液検査で異常がなければ入浴可能です				
排泄		 前日の排尿・排便回数を確認します				
活動	安静度  制限はありません。					
	リハビリ  呼吸リハビリテーションが開始される事があります					
観察項目		 内服を開始すると次のような症状がおこるかもしれません。一緒に確認して行きましょう ・食欲不振 胃部不快感 胸やけ 嘔気(吐き気) 倦怠感 眠気 めまい ふらつき				
看護ケア	 身長・体重測定	 10時・14時・20時ごろに検温を行います				
確認事項	 直射日光を避けるため廊下側のベッドへの入院とさせていただきます	 ・服用時間について ・疾患、副作用について			 ・光線過敏症対策について ・疾患、副作用について	
指導	 ・入院についての説明をします	 パンフレットを使用してピレスパについての説明を行います			 退院に向けての指導を行います ・お薬は食後に服用して下さい ・光線過敏症対策についてパンフレットを見ながら確認して行きます	退院後の生活についてパンフレットを使用して説明します 午前中に請求書をお渡します。お支払いを済ませて頂いたことを確認して、必要書類、お薬をお渡しします 名札を外して、退院となります
転倒転落予防	 転倒転落の危険性を評価し、予防策を説明します。危険性を示すプレートを表示します。ベッド柵は3箇所に設置します	・ふらつきがある場合は歩行に看護師が付き添います ・周囲の環境を整えます				

※ 患者様の状態により、内容の変更がございます。あらかじめご了承ください。